



## Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze

(d. Ornitologiczne)

ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ul. Monte Cassino 7/27, 70 – 465 Szczecin

e-mail: zto@eko.org.pl

Nr r-ku: PKO BP I O/Szczecin 70102047950000940200833145

Nr KRS 0000115468

REGON 810681817

NIP 852-14-00-870

### Wykaz gatunków na temat których gromadzone są informacje do Monografii Faunistycznej „Ptaki Pomorza Zachodniego”.

Zbierane są również najwcześniejsze i najpóźniejsze stwierdzenia w roku oraz nietypowe obserwacje fenologiczne np. gęsi zbożowej w lipcu czy bielaczka w czerwcu.

Granice Pomorza Zachodniego wyznaczają: od północy wybrzeże Bałtyku, od zachodu granica państwowa z Niemcami, od wschodu - wschodnie granice powiatów Kołobrzeg, Białogard, Drawsko Pomorskie, Wałcz i gminy Szczecinek oraz od południa granica administracyjna woj. zachodniopomorskiego z woj. lubuskim i wielkopolskim.

Nur czarnoszyi <i>Gavia arctica</i>	Wszystkie obserwacje
Nur rdzawoszyi <i>Gavia stellata</i>	Wszystkie obserwacje
Perkoz rdzawoszyi <i>Podiceps grisegena</i>	Wszystkie obserwacje
Perkoz dwuczuby <i>Podiceps cristatus</i>	Lęgowe, zimujące (stadka powyżej 50 os.), stadka powyżej 100 os.
Perkoz rogaty <i>Podiceps auritus</i>	Wszystkie obserwacje
Perkozek <i>Tachybaptus ruficollis</i>	Lęgowe, zimujące (stadka powyżej 10 os.), stadka powyżej 20 os.
Zausznik <i>Podiceps nigricollis</i>	Wszystkie obserwacje
Kormoran <i>Phalacrocorax carbo</i>	Lęgowe, stadka powyżej 500 os. (zimają w głębi łądu powyżej 100 os.), stałe noclegowiska
Czapla siwa <i>Ardea cinerea</i>	Lęgowe, stadka powyżej 50 os.
Czapla biała <i>Egretta alba</i>	Wszystkie obserwacje
Czapla nadobna <i>Egretta garzetta</i>	Wszystkie obserwacje
Czapla purpurowa <i>Ardea purpurea</i>	Wszystkie obserwacje
Ślepowron <i>Nycticorax nycticorax</i>	Wszystkie obserwacje
Bączek <i>Ixobrychus minutus</i>	Wszystkie obserwacje
Bąk <i>Botaurus stellaris</i>	Wszystkie obserwacje
Bocian biały <i>Ciconia ciconia</i>	Zimujące, stadka powyżej 50 os.
Bocian czarny <i>Ciconia nigra</i>	Wszystkie obserwacje
Łabędź niemy <i>Cygnus olor</i>	Lęgowe, stadka powyżej 100 os.
Łabędź krzykliwy <i>Cygnus cygnus</i>	Wszystkie obserwacje
Łabędź czarnodzioby <i>Cygnus columbianus</i>	Wszystkie obserwacje
Gęgawa <i>Anser anser</i>	Zimujące, stadka powyżej 500 os., stałe noclegowiska
Gęś zbożowa <i>Anser fabalis</i>	Stadka powyżej 1000 os., stałe noclegowiska
Gęś krótkodzioba <i>Anser brachyrhynchus</i>	Wszystkie obserwacje
Gęś białoczelna <i>Anser albifrons</i>	Stadka powyżej 1000 os., stałe noclegowiska

Bernikla białolica <i>Branta leucopsis</i>	Wszystkie obserwacje
Bernikla obrożna <i>Branta bernicla</i>	Wszystkie obserwacje
Bernikla kanadyjska <i>Branta canadensis</i>	Wszystkie obserwacje
Ohar <i>Tadorna tadorna</i>	Wszystkie obserwacje
Mandarynka <i>Aix galericulata</i>	Wszystkie obserwacje
Krzyżówka <i>Anas platyrhynchos</i>	Stada powyżej 1000 os.
Krakwa <i>Anas strepera</i>	Lęgowe, zimujące, stada powyżej 100 os.
Świstun <i>Anas penelope</i>	Zimujące, stada powyżej 100 os.
Cyraneczka <i>Anas crecca</i>	Lęgowe, zimujące, stada powyżej 100 os.
Cyranka <i>Anas querquedula</i>	Lęgowe, zimujące, stada powyżej 30 os.
Rożeniec <i>Anas acuta</i>	Lęgowe, zimujące, stada powyżej 100 os.
Płaskonos <i>Anas clypeata</i>	Lęgowe, zimujące, stada powyżej 50 os.
Hełmiatka <i>Netta rufina</i>	Wszystkie obserwacje
Głowienka <i>Aythya ferina</i>	Lęgowe, stada powyżej 500 os.
Czernica <i>Aythya fuligula</i>	Lęgowe, stada powyżej 1000 os.
Podgorzałka <i>Aythya nyroca</i>	Wszystkie obserwacje
Ogorzałka <i>Aythya marila</i>	Wszystkie obserwacje poza wybrzeżem i Zalewem Szczecińskim (na zalewie i wybrzeżu stada powyżej 1000 os.)
Gągoł <i>Bucephala clangula</i>	Lęgowe, stada powyżej 500 os.
Uhla <i>Melanitta fusca</i>	Wszystkie obserwacje poza wybrzeżem, na wybrzeżu stadka powyżej 10 os.
Markaczka <i>Melanitta nigra</i>	Wszystkie obserwacje poza wybrzeżem, na wybrzeżu stadka powyżej 100 os.
Lodówka <i>Clangula hyemalis</i>	Wszystkie obserwacje poza wybrzeżem, na wybrzeżu stada powyżej 1000 os.
Edredon <i>Somateria mollissima</i>	Wszystkie obserwacje poza wybrzeżem, na wybrzeżu stadka powyżej 10 os.
Nurogęś <i>Mergus merganser</i>	Lęgowe, stada powyżej 500 os.
Szlachar <i>Mergus serrator</i>	Wszystkie obserwacje poza wybrzeżem, na wybrzeżu stada powyżej 100 os.
Bielaczek <i>Mergus albellus</i>	Wszystkie obserwacje poza Zalewem Szczecińskim i wybrzeżem (na zalewie powyżej 1000 os.)
Orzeł przedni <i>Aquila chrysaetos</i>	Wszystkie obserwacje
Orlik krzykliwy <i>Aquila pomarina</i>	Wszystkie obserwacje
Bielik <i>Haliaeetus albicilla</i>	Lęgowe, zgrupowania powyżej 10 os.
Rybołów <i>Pandion haliaetus</i>	Wszystkie obserwacje
Myszołów <i>Buteo buteo</i>	Zgrupowania powyżej 50 os.
Myszołów włochaty <i>Buteo lagopus</i>	Wszystkie obserwacje
Trzmielojad <i>Pernis apivorus</i>	Wszystkie obserwacje
Jastrząb <i>Accipiter gentilis</i>	Lęgowe
Krogulec <i>Accipiter nisus</i>	Lęgowe
Kania ruda <i>Milvus milvus</i>	Lęgowe, zimujące
Kania czarna <i>Milvus migrans</i>	Wszystkie obserwacje
Błotniak stawowy <i>Circus aeruginosus</i>	Lęgowe, zimujące
Błotniak zbożowy <i>Circus cyaneus</i>	Wszystkie obserwacje
Błotniak łąkowy <i>Circus pygargus</i>	Wszystkie obserwacje
Sokół wędrowny <i>Falco peregrinus</i>	Wszystkie obserwacje

Kobuz <i>Falco subbuteo</i>	Lęgowe, zimujące, stadka powyżej 5 os.
Drzemlik <i>Falco columbarius</i>	Wszystkie obserwacje
Kobczyk <i>Falco vespertinus</i>	Wszystkie obserwacje
Pustułka <i>Falco tinnunculus</i>	Lęgowe
Kuropatwa <i>Perdix perdix</i>	Wszystkie obserwacje
Jarząbek <i>Bonasa bonasia</i>	Wszystkie obserwacje
Przepiórka <i>Coturnix coturnix</i>	Wszystkie obserwacje
Żuraw <i>Grus grus</i>	Lęgowe, zimujące, stada powyżej 500 os., stałe noclegowiska
Wodnik <i>Rallus aquaticus</i>	Lęgowe, zimujące
Kropiatka <i>Porzana porzana</i>	Wszystkie obserwacje
Zielonka <i>Porzana parva</i>	Wszystkie obserwacje
Derkacz <i>Crex crex</i>	Wszystkie obserwacje
Kokoszka <i>Gallinula chloropus</i>	Lęgowe, zimujące, stadka powyżej 10 os.
Łyska <i>Fulica atra</i>	Stada powyżej 1000 os.
Ostrygojad <i>Haematopus ostralegus</i>	Wszystkie obserwacje
Czajka <i>Vanellus vanellus</i>	Lęgowe, zimujące, stada powyżej 500 os.
Sieweczka obrożna <i>Charadrius hiaticula</i>	Lęgowe, stadka powyżej 10 os.
Sieweczka rzeczna <i>Charadrius dubius</i>	Lęgowe, stadka powyżej 10 os.
Siewnica <i>Pluvialis squatarola</i>	Stadka powyżej 10 os., obserwacje wiosenne, wszystkie obserwacje poza wybrzeżem
Siewka złota <i>Pluvialis apricaria</i>	Stada powyżej 100 os., zimujące
Szablodziób <i>Recurvirostra avosetta</i>	Wszystkie obserwacje
Biegus rdzawy <i>Calidris canutus</i>	Wszystkie obserwacje
Piaskowiec <i>Calidris alba</i>	Wszystkie obserwacje
Biegus malutki <i>Calidris minuta</i>	Wszystkie obserwacje
Biegus mały <i>Calidris temminckii</i>	Wszystkie obserwacje
Biegus krzywodzioby <i>Calidris ferruginea</i>	Wszystkie obserwacje
Biegus zmienny <i>Calidris alpina</i>	Lęgowe, wszystkie obserwacje poza wybrzeżem. Na wybrzeżu stadka powyżej 50 os., zimujące
Biegus płaskodzioby <i>Limicola falcinellus</i>	Wszystkie obserwacje
Batalion <i>Philomachus pugnax</i>	Stadka powyżej 50 os.
Bekasik <i>Lymnocyptes minimus</i>	Wszystkie obserwacje
Kszyk <i>Gallinago gallinago</i>	Lęgowe, zimujące, stadka powyżej 50 os.
Dubelt <i>Gallinago media</i>	Wszystkie obserwacje
Słonka <i>Scolopax rusticola</i>	Wszystkie obserwacje
Rycyk <i>Limosa limosa</i>	Wszystkie obserwacje
Szlamnik <i>Limosa lapponica</i>	Wszystkie obserwacje
Kulik mniejszy <i>Numenius phaeopus</i>	Wszystkie obserwacje
Kulik wielki <i>Numenius arquata</i>	Lęgowe, zimujące, stadka powyżej 50 os.
Brodziec śniady <i>Tringa erythropus</i>	Stadka powyżej 10 os.
Krwawodziób <i>Tringa totanus</i>	Lęgowe, zimujące, stadka powyżej 10 os.
Brodziec pławny <i>Tringa stagnatilis</i>	Wszystkie obserwacje
Kwokacz <i>Tringa nebularia</i>	Stadka powyżej 10 os.
Samotnik <i>Tringa ochropus</i>	Lęgowe, zimujące, stadka powyżej 10 os.
Łęczak <i>Tringa glareola</i>	Stadka powyżej 50 os.
Brodziec piskliwy <i>Actitis hypoleucos</i>	Lęgowe, zimujące, stadka powyżej 10 os.
Kamusznik <i>Arenaria interpres</i>	Wszystkie obserwacje

Płatkonóg szydłodzioby <i>Phalaropus lobatus</i>	Wszystkie obserwacje
Wydrzyk ostrosterny <i>Stercorarius parasiticus</i>	Wszystkie obserwacje
Mewa czarnogłowa <i>Larus melanocephalus</i>	Wszystkie obserwacje
Mewa mała <i>Larus minutus</i>	Zimujące, stada powyżej 100 os.
Śmieszka <i>Larus ridibundus</i>	Lęgowe, stada powyżej 2000 os.
Mewa pospolita <i>Larus canus</i>	Lęgowe, stada powyżej 1000 os.
Mewa żółtonoga <i>Larus fuscus</i>	Wszystkie obserwacje
Mewa srebrzysta <i>Larus argentatus</i>	Lęgowe, stada powyżej 2000 os.
Mewa białogłowa <i>Larus cachinnans</i>	Wszystkie obserwacje
Mewa romańska <i>Larus michahellis</i>	Wszystkie obserwacje
Mewa siodłata <i>Larus marinus</i>	Wszystkie obserwacje poza wybrzeżem oraz Odrą w Szczecinie i Gryfinie (z wybrzeża, Szczecina i Gryfina powyżej 50 os.). W okresie IV- VIII powyżej 10 os.
Rybitwa wielkodzioba <i>Hydroprogne caspia</i>	Wszystkie obserwacje
Rybitwa czubata <i>Sterna sandvicensis</i>	Wszystkie obserwacje
Rybitwa rzeczna <i>Sterna hirundo</i>	Lęgowe, stadka powyżej 50 os.
Rybitwa popielata <i>Sterna paradisaea</i>	Wszystkie obserwacje
Rybitwa białoczelna <i>Sternula albifrons</i>	Lęgowe, stadka powyżej 20 os.
Rybitwa białowąsa <i>Chlidonias hybrida</i>	Wszystkie obserwacje
Rybitwa czarna <i>Chlidonias niger</i>	Lęgowe, stadka powyżej 50 os.
Rybitwa białoskrzydła <i>Chlidonias leucopterus</i>	Wszystkie obserwacje
Alka <i>Alca torda</i>	Wszystkie obserwacje
Nurzyk <i>Uria aalge</i>	Wszystkie obserwacje
Nurnik <i>Cephus grylle</i>	Wszystkie obserwacje
Gołąb miejski <i>Columba livia forma urbana</i>	Populacje lęgowe poza Szczecinem
Siniak <i>Columba oenas</i>	Lęgowe, zimujące, stadka powyżej 50 os.
Grzywacz <i>Columba palumbus</i>	Zimujące poza Szczecinem, stada powyżej 500 os.
Sierpówka <i>Streptopelia decaocto</i>	Stada powyżej 100 os.
Turkawka <i>Streptopelia turtur</i>	Wszystkie obserwacje
Płomykówka <i>Tyto alba</i>	Wszystkie obserwacje
Puchacz <i>Bubo bubo</i>	Wszystkie obserwacje
Sóweczka <i>Glaucidium passerinum</i>	Wszystkie obserwacje
Pójdźka <i>Athene noctua</i>	Wszystkie obserwacje
Puszczyk uralski <i>Strix uralensis</i>	Wszystkie obserwacje
Uszatka <i>Asio otus</i>	Wszystkie obserwacje
Uszatka błotna <i>Asio flammeus</i>	Wszystkie obserwacje
Włochatka <i>Aegolius funereus</i>	Wszystkie obserwacje
Lelek <i>Caprimulgus europaeus</i>	Wszystkie obserwacje
Jerzyk <i>Apus apus</i>	Stada powyżej 500 os.
Zimorodek <i>Alcedo atthis</i>	Lęgowe
Dudek <i>Upupa epops</i>	Wszystkie obserwacje
Kraska <i>Coracias garrulus</i>	Wszystkie obserwacje
Żoła <i>Merops apiaster</i>	Wszystkie obserwacje
Dzięcioł zielony <i>Picus viridis</i>	Lęgowe
Dzięcioł zielonosiwy <i>Picus canus</i>	Wszystkie obserwacje

Dzięcioł średni <i>Dendrocopos medius</i>	Wszystkie obserwacje
Skowronek <i>Alauda arvensis</i>	Zimujące, stada powyżej 500 os.
Dzierlatka <i>Galerida cristata</i>	Wszystkie obserwacje
Górniczek <i>Eremophila alpestris</i>	Wszystkie obserwacje
Lerka <i>Lullula arborea</i>	Zimujące, stadka powyżej 10 os.
Brzegówka <i>Riparia riparia</i>	Lęgowe, stada powyżej 500 os.
Dymówka <i>Hirundo rustica</i>	Stada powyżej 500 os.
Oknówka <i>Delichon urbicum</i>	Stada powyżej 100 os.
Świergotek polny <i>Anthus campestris</i>	Wszystkie obserwacje
Świergotek łąkowy <i>Anthus pratensis</i>	Zimujące, stada powyżej 50 os.
Świergotek rdzawogardły <i>Anthus cervinus</i>	Wszystkie obserwacje
Świergotek nadmorski <i>Anthus petrosus</i>	Wszystkie obserwacje
Siwerniak <i>Anthus spinoletta</i>	Wszystkie obserwacje
Pliszka żółta <i>Motacilla flava thunbergi</i>	Wszystkie obserwacje
Pliszka żółta <i>Motacilla flava</i>	Stadka powyżej 100 os.
Pliszka górską <i>Motacilla cinerea</i>	Wszystkie obserwacje
Pliszka siwa <i>Motacilla alba</i>	Zimujące, stadka powyżej 50 os.
Jemiołuszka <i>Bombycilla garrulus</i>	Wszystkie obserwacje
Pluszcz <i>Cinclus cinclus</i>	Wszystkie obserwacje
Pokrzywnica <i>Prunella modularis</i>	Zimujące
Podróżniczek <i>Luscinia svecica</i>	Wszystkie obserwacje
Słownik rdzawy <i>Luscinia megarhynchos</i>	Lęgowe
Słownik szary <i>Luscinia luscinia</i>	Lęgowe
Kopciuszek <i>Phoenicurus ochruros</i>	Zimujące
Pokląskwa <i>Saxicola rubetra</i>	Stadka powyżej 10 os.
Kląskawka <i>Saxicola rubicola</i>	Wszystkie obserwacje
Białorzotka <i>Oenanthe oenanthe</i>	Lęgowe, stadka powyżej 10 os.
Śpiewak <i>Turdus philomelos</i>	Zimujące
Drozd obrożny <i>Turdus torquatus</i>	Wszystkie obserwacje
Kwiczol <i>Turdus pilaris</i>	Stada powyżej 300 os.
Paszkot <i>Turdus viscivorus</i>	Zimujące, stadka powyżej 10 os.
Drożdżik <i>Turdus iliacus</i>	Lęgowe, zimujące, stadka powyżej 100 os.
Wodniczka <i>Acrocephalus paludicola</i>	Wszystkie obserwacje
Strumieniówka <i>Locustella fluviatilis</i>	Wszystkie obserwacje
Jarzębatka <i>Sylvia nisoria</i>	Wszystkie obserwacje
Kapturka <i>Sylvia atricapilla</i>	Zimujące
Pierwiosnek <i>Phylloscopus collybita</i>	Zimujące
Zniczek <i>Regulus ignicapilla</i>	Wszystkie obserwacje
Muchołówka mała <i>Ficedula parva</i>	Wszystkie obserwacje
Muchołówka białoszyja <i>Ficedula albicollis</i>	Wszystkie obserwacje
Wąsatka <i>Panurus biarmicus</i>	Lęgowe, stadka powyżej 50 os.
Raniuszek <i>Aegithalos caudatus europaeus</i>	Wszystkie obserwacje
Remiz <i>Remiz pendulinus</i>	Lęgowe, zimujące, stadka powyżej 30 os.
Srokosz <i>Lanius excubitor</i>	Wszystkie obserwacje
Sroka <i>Pica pica</i>	Stadka powyżej 50 os.
Orzechówka <i>Nucifraga caryocatactes</i>	Wszystkie obserwacje
Kawka <i>Corvus monedula</i>	Stada powyżej 500 os.
Gawron <i>Corvus frugilegus</i>	Lęgowe, stada powyżej 1000 os., stałe

	noclegowiska
Czarnowron <i>Corvus corone</i>	Wszystkie obserwacje
Wrona siwa <i>Corvus cornix</i>	Stada powyżej 100 os.
Kruk <i>Corvus corax</i>	Lęgowe, stadka powyżej 50 os.
Sójka <i>Garrulus glandarius</i>	Stadka powyżej 50 os.
Szpak <i>Sturnus vulgaris</i>	Zimujące, koncentracje powyżej 5000 os.
Wróbel <i>Passer domesticus</i>	Stada powyżej 100 os.
Mazurek <i>Passer montanus</i>	Stada powyżej 100 os.
Zięba <i>Fringilla coelebs</i>	Stada powyżej 500 os.
Jer <i>Fringilla montifringilla</i>	Stada powyżej 100 os., obserwacje z sezonu lęgowego
Kulczyk <i>Serinus serinus</i>	Zimowe, stadka powyżej 20 os.
Dzwoniec <i>Carduelis chloris</i>	Stada powyżej 500 os.
Szczygieł <i>Carduelis carduelis</i>	Stada powyżej 500 os.
Czyż <i>Carduelis spinus</i>	Lęgowe, stadka powyżej 500 os.
Makolągwa <i>Carduelis cannabina</i>	Stada powyżej 200 os.
Rzepołuch <i>Carduelis flavirostris</i>	Wszystkie obserwacje
Czczotka <i>Carduelis flammea</i>	Wszystkie obserwacje
Krzyżodziób świerkowy <i>Loxia curvirostra</i>	Wszystkie obserwacje
Dziwonia <i>Carpodacus erythrinus</i>	Lęgowe
Gil <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Lęgowe, stadka powyżej 50 os.
Grubodziób <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Stadka powyżej 50 os.
Śnieguła <i>Plectrophenax nivalis</i>	Wszystkie obserwacje
Trznadel <i>Emberiza citrinella</i>	Stada powyżej 500 os.
Ortolan <i>Emberiza hortulana</i>	Wszystkie obserwacje
Potrzos <i>Emberiza schoeniclus</i>	Stadka powyżej 50 os.
Potrzeszcz <i>Emberiza calandra</i>	Stada powyżej 100 os.